








	(1) meno di 100g	(2) tra 100 e 200g	(3) oltre 200g
<b>(A) Dure &amp; Formate</b> - consistenza dura - mantengono una determinata forma - come una banana o un sigaro	A1  0cm 10cm	A2  0cm 10cm	A3  0cm 10cm
<b>(B) Soffici &amp; Formate</b> - conservano complessivamente la propria forma - come burro d'arachidi	B1  0cm 10cm	B2  0cm 10cm	B3  0cm 10cm
<b>(C) Sciolte &amp; Non Formate</b> - senza forma riconoscibile - diffondono facilmente - come pappa o un frullato denso	C1  0cm 10cm	C2  0cm 10cm	C3  0cm 10cm
<b>(D) Liquide</b> - fluide - acquose	D1  0cm 10cm	D2  0cm 10cm	D3  0cm 10cm

# King's Stool Chart

© 2001 King's College London  
[www.kcl.ac.uk/stoolchart](http://www.kcl.ac.uk/stoolchart)

## Istruzione d'uso

- 1) Prima di tutto valuta la **consistenza** delle feci conformemente con le 4 categorie in uso, avvalendoti sia delle descrizioni scritte che di quelle fotografie (A, B, C, D).
- 2) In seguito, stima il **peso** delle feci facendo uso delle descrizioni fotografiche (1, 2, 3). Valuta la dimensione delle feci usando il righello da 10 cm e quindi comparala con le dimensioni presenti nelle fotografie.
- 3) Annotare il **frequenza** di defecamenti in 24 ore.
- 4) Qualsiasi **altra caratteristica** di rilievo associata col defecamento deve pure essere annotata, come per esempio incontinenza, colore ed altro.

Sucu Dag G, Dicle A, Saka O, Whelan K. Assessment of the Turkish version of the King's Stool Chart for evaluating stool output and diarrhea among patients receiving enteral nutrition. *Gastroenterology Nursing*. 2015; 38: 218-25.

Whelan K, Judd PA, Preedy VR, Taylor MA. Covert assessment of concurrent and construct validity of a chart to characterize fecal output and diarrhea in patients receiving enteral nutrition. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*. 2008; 32: 160-168.

Whelan K, Judd PA, Taylor MA. Assessment of faecal output in patients receiving enteral tube feeding: validation of a novel chart. *European Journal of Clinical Nutrition*. 2004; 58: 130-137.

Whelan K, Judd PA, Taylor MA. Defining and reporting diarrhoea during enteral tube feeding: do health professionals agree? *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. 2003; 16: 21-26.